

L'ORÉAL
PARIS

EXCELLENCE Creme

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ
בערכה זו תמצאי

Την Κρέμα Βαφή

1a
שופור
קרם צבע

Το Οξειδωτικό
και το απλικάτερ - χτένα

NEO Το Σαμπουάν Φροντίδας
με Απαλό pH, μετά τη Βαφή

Την Απαλή Μάσκα Θρέψης
για πολλαπλές χρήσεις

'Ενα ζευγάρι
γάντια

1b
קרם מפותח במקל פיזור עם פית אפליקטור
בתוסספס פית מסרק להחלפתה

2
תוספט חדשה
שampoo מטפה
עם עדין לשימוש לאחר הצביעת

3
מסכת הוזן
לשימוש רב פעמי

+
וז כפפות
מקצועיות



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Το προϊόν αυτό δεν προσφέται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

! Αλλεργία: ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΓΝΟΕΙΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ.

Είναι υποχρεωτικό να λάβετε **ΣΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ώρες** πριν από κάθε χρήση αυτού του προϊόντος, καθώς οι αλλεργίες μπορεί να εμφανιστούν αιφνίδια, ακόμη κι αν έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν προϊόν βαφής της ίδιας ή άλλης μάρκας.

Αυτό το τεστ αποτελεί μια σημαντική προφλομένη, αποδειχμένη αξίζεινό θέμα προστασίας από αλλεργίες στο παρελθόν, υπάρχει πιθανότητα να αντιμετωπίσεται κάποιος είδους αλλεργία κατά τη διάρκεια της βαφής των μαλλιών σας. Το τεστ προειδοποίησης αλλεργίας δεν αποτελεί εγγύηση για να αποφύγετε μελλοντικές αντιδράσεις. **Παρακαλείστε από συμβουλευτές τον προσωπικό σας γιατρό, έναν έπειτα από οικείους αλλεργίες.**

! Σημαντικό: ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.

Προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης διαβάστε προσεκτικά και ακολούθηστε απορρετήστε τις παρακάτω οδηγίες.

! Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑΣ "ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΑΣ" ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΒΑΦΗΣ, ΑΙΧΜΗ ΑΝ ΚΙ ΕΙΧΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΟΥ:

• Αν έχετε εμφανίσει αλλεργική αντίδραση σε προσωπικά "μαύρης χένας" στο παρελόνι, μην χρησιμοποιείτε στη βαφή των μαλλιών σας σε καμία περίπτωση. Είναι ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά τη βαφή των μαλλιών σας.

• Ακόμη κι αν δεν έχετε εμφανίσει κάποια αντίδραση, μπορεί να είστε απλεργική χωρίς να το γνωρίζετε: ποτέ να μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, έναν δεν έχετε κάνει τεστ προειδοποίησης αλλεργίας 48 ώρες πριν τη χρήση.

ΠΟΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ: 48 ώρες πριν τη χρήση της βαφής. Αφοράτε το οικυλαρίκια. Τοποθετήστε πίσω από το αυτί, με τη βοήθεια μιας ματαντούς, μια ακριβή ποσόστηση προϊόντος που δεν έχει αναμεγέθει (συλληνέργοι κρέμα βαφή 1a) και καλύψτε επιράντα ιστη με ένα λεπτό του ευρώ. Λεφτό το να στεγνώσετε. Κλείστε κάλι το πώμα του προϊόντος της βαφής για να το συντηρήσετε για χρήση 48 ώρες μετά. Περιμένετε 48 ώρες χωρίς να λουστετε, καλύψτε ή γήγετε το ομέλο. Αν μέσα σε αυτό το διάστημα παρατηρήσετε με φυσιολογικές αντιδράσεις, όπως κηκυριά, κοκκινώλη ή πρήξιμο στην περιοχή του πετστή ή γύρω από αυτό, **ΜΗΝ ΤΡΟΧΟΧΩΡΙΣΤΕ ΣΤΗ ΒΑΦΗ.**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Σε περίπτωση αντίδρασης κατά την εφαρμογή όπως: Τομπήμα, ερεθισμός, σπυράκια, οισθομένη καψκύματα στην τρύπα, ξελύσσεις από τη βαφή, συμβαύματα και διακόπτες τη χρήση, Συμβαύματα στην αναπνοή, ανοιχτήστε την αναπνοή, ομέρως ιατρική βοήθεια. Πριν προσφέτετε σε νέα βαφή, συμβαύετε το μαρό σας. Εάν, κατά τη διάρκεια των μαλλιών μετά την εφαρμογή, εμφανίστε φαγούρια, κοκκινώλη ή σπυράκια στο τριχόπτονο, κρίνεται στην επιδερμίδα, πρήξιμο των ματων και την προσθέτινη φωσφατίδα στην ιστη σπερμιλίδα συμπάτεται να συμβαύετε εναγκαρό. Κρατήστε το δέσιο κουτι και τις σδιόλες χρήσης για μερικές μερές μετά την εφαρμογή.

• Να φοράτε τα καταλόγων γόντια των περιέχουν επαγγελματικές αποκαταστάσεις από τα μαλλιά σας πριν τη βαφή και διατηρήστε τα μακριά κατά τη διάρκεια της βαφής. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικό εργαλείο styling.

• Η προστασία και η εφαρμογή του προϊόντος για να βάψετε τα φρύδια και τις πλευροφίδες. Αυτό το προϊόν περιέχει ινσταντανέα από το οποίο μπορείται να βάψετε τα μαλλιά σας σε επώπιο με το πρόδιον. Εάν φοράτε εργαλείο επαργίας, αραιάρετε τους πριν ξελύσσετε τα μάτια σας πριν μπορείτε να βάψετε τα φρύδια και τις πλευροφίδες. Αυτό το προϊόν περιέχει ινσταντανέα από το οποίο μπορείται να βάψετε τα μαλλιά σας σε επώπιο με το πρόδιον. Εάν φοράτε εργαλείο επαργίας, αραιάρετε τους πριν ξελύσσετε τα μάτια. Και στις δύο περιπτώσεις, ζητάτε ιατρικό συμβούλιο. • Να μην επιστρέψετε τη βαφή σας. Αν έχετε ματων και την εφαρμογή. • Απορρύπανσης 9/9/10/10.21: Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα. • Ξεπλύντε καλά τα μαλλιά μετά την εφαρμογή. • Απορρύπανσης 9/9/10/10.21: Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα. • Απορρύπανσης 9/9/10/10.21: Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα. • Απορρύπανσης 9/9/10/10.21: Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα. • Απορρύπανσης 9/9/10/10.21: Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μαλλά με ιατρική. Να περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από διαδικασία ξανόλγισμας, περιμέναντε ή τεχνική διαδικασία λελανσής των προϊόντων με την επέρημηδα.

Απορρύπανσης 6.66/8.93/10.13: Να μην χρησιμοποιείτε σε μα